



34 EDICIÓN NACIONAL 2017

FORMACIÓN S.E.G.O. | OVIEDO



EPIDEMIOLOGIA DE 286 EMBARAZOS GEMELARES

Sánchez Rivadulla, Laura; Domínguez Olivera, Nadia; Laíño Calo, Eva María; Gómez Alonso, Belén; González Seoane, Raquel; Veiga Tuimil, Manuel A.

SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, XXIF.

OBJETIVOS

Conocer los datos epidemiológicos del embarazo gemelar en nuestra área de salud.

MATERIAL

Se estudió una cohorte de 286 embarazos gemelares entre 1999 y 2016.

Los datos se recogieron retrospectivamente del registro informático de partos, del registro de mortalidad perinatal y de las historias clínicas del hospital.




Se estudiaron la edad y paridad maternas, el modo de consecución del embarazo, la corionicidad, la distribución peso-edad gestacional y el tipo de parto.

RESULTADOS


La incidencia de embarazo gemelar en nuestra área es de 1,35% del total de partos.

DISTRIBUCIÓN PESO/EDAD GESTACIONAL EN LOS NACIDOS GEMELARES

	20-27	28-31	32-36	37-41	42 ó más	desconocido	total
500-999	12	3	2				17
1000-1499	3	16	10			2	31
1500-1999	1	18	65	13			97
2000-2499			73	91		2	166
2500-2999			38	168			206
3000-3499			3	48			51
≥3500				4			4
Total	16	37	191	324		4	572



TIPO DE PARTO



CONCLUSIONES

La edad más frecuente en los embarazos gemelares se encuentra en el intervalo 31-35 años.

Es más habitual un embarazo gemelar entre mujeres sin partos previos.

La corionicidad más común es bicorial-biamniótica.

En relación a la consecución del embarazo destacan los embarazos gemelares espontáneos seguidos de los embarazos por FIV-TE.

El tipo de parto más frecuente son las cesáreas.

La tasa de prematuros y recién nacidos de bajo peso son elevadas.

Nuestros datos son similares a los de la mayoría de las series publicadas.

