

Tratamento médico do aborto diferido

É un procedemento mediante o cal se lle indica unha medicación co propósito de extraer do útero produto non viable da xestación sen necesidade de cirurxía.

Que é...?

É un procedemento mediante o cal se lle indica unha medicación co propósito de extraer do útero o produto non viable da xestación sen necesidade de cirurxía.

Como funciona/realízase?

Realízase administrando unha medicación por vía vaginal que fai que o útero se contraia e expulse o feto e a placenta. O fármaco utilizado é o misoprostol que é un medicamento utilizado para tratar as úlceras gastroduodenales. Ademais desta indicación está demostrada a súa acción tanto como inductor do parto e na hemorraxia postparto, como na evacuación uterina do aborto. Todas elas son indicacións xinecolóxicas e obstétricas non aprobadas no momento actual pola Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios (AEMPS), polas que se require tramitación especial.

Devandito fármaco administrárase nunha soa dose e días máis tarde realizarase un control ecográfico para comprobar a adecuada evacuación uterina e, en caso contrario, valorar a realización dun legrado evacuador.

Tras a administración deste fármaco recoméndase utilizar un método anticonceptivo fiable polo menos durante o seguinte ciclo menstrual.

Que riscos ou complicacións pode ter?/ Que máis debo saber antes de?

Frecuentes e leves:

- Sangrado vaginal (Hemorraxia)
- Dor abdominal.
- Flatulencia (e/ou diarrea)
- Cefalea.

Pouco frecuentes e graves

- A información contida nesta páxina foi elaborada ou seleccionada e revisada por profesionais do Servizo Galego de Saúde e as súas recomendacións non substitúen ao consello médico.
- Esta obra está baixo dunha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported

- Reacción alérxica ao medicamento ou de hipersensibilidade ao medicamento.
- Hemorraxia severa que requira transfusión sanguínea
- Hipertermia (aumento da temperatura)
- Letargia (decaimento)
- Vertixes
- Aborto incompleto, que pode obrigar á realización dun legrado evacuador
- Infección do aparello xenital

Cales son as alternativas?

Tratamento cirúrxico (legrado obstétrico evacuador) ou manexo expectante, con menores taxas de éxito.

Co tratamento médico do aborto diferido obtéñense similares taxas de eficacia que co tratamento cirúrxico (legrado), evitando o ingreso hospitalario, o uso de anestesia e as complicacións que se poden derivar do devandito proceso.

Autor/es

- Información baseada en el documento de consentimiento informado aprobado por la EOXI de A Coruña / Organización: Servicio Gallego de Salud

Data de actualización

20/07/2016

-
- A información contida nesta páxina foi elaborada ou seleccionada e revisada por profesionais do Servizo Galego de Saúde e as súas recomendacións non substitúen ao consello médico.
 - Esta obra está baixo dunha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported